



RH
23 III 34

CANARDS SUR LA GLACE

colvert mâle nilet femelle colvert mâle nilet mâle colvert mâle colvert femelle colvert mâle



R.H.
ISVI 32

HERON BLONGIOS



R.H.
22 III 34

Pilet mâle, pilet femelle, sarcelle d'été femelle

Les oiseaux du marais de Grône

par R. HAINARD

En aval de Grône, entre la digue du Rhône et la pente de la montagne, s'étend un marais formé, dans sa partie la plus profonde, par un ancien bras du fleuve. Un ruisseau limpide le traverse en serpentant ; en amont, ce sont des terrains graveleux formant une lande buissonnante, puis un bois humide comprenant de magnifiques Peupliers, des fourrés de Vernes, Pins, Bouleaux, Argousiers ; en aval, une assez vaste phragmitaie, coupée de nappes d'eau ou de vase, selon les saisons. Quelques cônes de sable si caractéristiques du Valais en émergent.

Lors de séjours en Valais, j'ai pris grand intérêt à ce marais. Non qu'on y voie quoi que ce soit qui ne se retrouve facilement ailleurs, non qu'il offre de grandes facilités d'observation, bien que sa population d'oiseaux soit assez dense. Mais son caractère particulier, le rapport de ce bout de plaine humide et des versants, l'atmosphère du Valais lui donnent un intérêt qui soutient la comparaison avec d'autres régions plus riches pour le naturaliste.

J'y ai vu, les 13 et 14 juin 1933 : Grèbes castagneux, *Podiceps r. ruficollis* (Pall.), Râles d'eau, *Rallus a. aquaticus* (L.), Poules



Martin-pêcheur

d'eau, *Gallinula c. chloropus* (L.), nid avec 5 œufs, Héron blongios, *Ixobrychus m. minutus* (L.), Martin pêcheur, *Alcedo atthis ispida* (L.), nid dans une sablière au bord de la route, un autre, probablement, à 200 m. du premier. Nombreuses Effarvattes, *Acrocephalus s. scirpaceus* (Vieill.), Rousserolles turdoïdes, *Acrocephalus a. arundinaceus* (L.), nid avec 4 œufs, Verderolles, *Acrocephalus palustris* (Bechst.), Bruants de roseaux, *Emberiza sch. schœniculus* (L.).

alentours : Fauvettes grisettes, *Sylvia c. communis* (Luth.), Pipit des buissons, *Anthus t. trivialis* (L.), Geais, *Garrulus g. glandarius* (L.), Coucou, *Cuculus c. canorus* (L.), Bondrée, *Pernis a. apivorus* (L.), Cresserelle, *Falco t. tinnunculus* (L.).

Parties graveleuses et sèches : Alouettes lulu, *Lullula a. arboorea* (L.), jeune tapi dans une ornière et parents, Faisan, *Phasianus colchicus* (L.). Marais d'Uvrier, le 14 juin, Effarvattes, nombreuses Verderolles, Râle d'eau.

Printemps 1934 : Corneille noire, *Corvus c. corone* (L.), Pie, *Pica p. pica* (L.), Geai, *Garrulus g. glandarius* (L.), 16 mars ; Linotte *Carduelis c. cannabina* (L.), Chardonneret, *Carduelis c. carduelis* (L.), Tarin, *Carduelis s. spinus* (L.), Bruant jaune, *Emberiza c. citrinella* (L.), Bruant des roseaux, *Emberiza s. schœniculus* (L.), 22-23 mars et 16 avril ; Pipit spioncelle, *Anthus s. spinoletta* (L.), Rhône, 13 mars ; Bergeronnette grise, *Motacilla a. alba* (L.), Mésange charbonnière, *Parus m. major* (L.), Mésange nonnette, *Parus palustris communis* (Baldenst.), Mésange à longue queue, *Aegithalos caudatus*, Roitelet huppé, *Regulus r. regulus* (L.), Pouillot veloce, *Phylloscopus c. collybita*, 23 mars ; Locustelle tachetée, *Locustella n. naevia* (Bechst.) chant dans les roseaux le 17 avril ; Effarvatte, *Acrocephalus streperus*, 17 avril ; Grive musicienne, *Turdus p. philomelos* (Brehm.), Merle noir, *Turdus m. merula* (L.), Rouge-gorge, *Erithacus r. rubecula* (L.), Troglodyte, *Troglodytes t. troglodytes* (L.), Merle d'eau, *Cinclus cinclus meridionalis* (Brehm), sur le Rhône, les individus que j'ai pu voir de près avaient le ventre roux ; Hirondelle de rochers, *Riparia r. rupestris* (Scop.), sur le Rhône 22 mars ; Martin pêcheur, *Alcedo atthis ispida*, 13, 23 mars et 16 avril ; Pic vert, *Picus viridis*, Faucon crecerelle, *Falco tinnunculus* (L.), Buse, *Buteo b. buteo* (L.), 23-24 mars ; Autour, *Accipiter g. gentilis* (L.), un jeune posé sur des roseaux couchés, au bord du ruisseau, 23 mars, c'est probablement lui que j'ai entrevu un instant auparavant,

chassant les Pies dans les buissons. Héron cendré, *Ardea c. cinerea* (L.), 2 individus au vol, 19 mars, un posé au bord du Rhône, 26 mars. Canard sauvage, *Anas p. platyrhinca* (L.), 13 mars, 5



Jeune autour

mâles, 16, 19 (5 couples), 22 (3 couples), 23 (9, graviers du Rhône) ; après-midi, sur la gouille près de la route, 15 colverts ou davantage, avec 2 Pilets, 3 Sarcelles d'été), 24, 26 (2 ou 3), 16 avril, un couple sur le Rhône, 17 avril un couple.

Sarcelle d'Hiver, *Anas c. crecca* (L.), 23 mars, un mâle ; Sarcelle d'été *Anas querquedula* (L.), 13 mars un mâle, 22 mars un mâle, puis un mâle et deux femelles le 22-23 mars. Canard Pilet, *Anas a. acuta*, un couple 22-23 mars. Grèbe castagneux, *Podiceps r. ruficollis* (L.), 22, 23 mars 17 avril, Chevalier guignette, *Tringa hypoleucos* (L.), Rhône, 16 avril ; Râle d'eau, *Rallus a. aquaticus* (L.), 22, 24 mars ; Foulque, *Fulica a. atra* (L.), 2 individus le 17 avril.

Enfin, le 26 janvier 1929, j'avais vu une Bécassine, *Capella g. gallinago* (L.), et une Poule d'eau, *Gallinula c. chloropus* (L.), qui s'esquivaient en plongée dans le ruisseau.

Au printemps 1934, je vis aussi des traces de Loutre dans la vase du marais (22 mars), puis le 24 à l'embouchure du ruisseau dans le Rhône des traces de Loutre dont une à peine plus grosse qu'une trace d'Hermine.